

اپیدمیولوژی، واژه‌شناسی و فیزیولوژی بی‌دندانی پارسیل / فصل ۱ رفرنس

۱- کدامیک از اهداف درمان‌های پروتزی نمی‌باشد؟

- (الف) حذف بیماری‌ها
ب) برطرف کرن نیاز اصلی بیمار
ج) حفظ سلامت ساختارهای دندانی
د) بازسازی فانکشن دهان

۲- کدام جمله صحیح نمی‌باشد؟

- الف) دندان‌های ماگزیلا پیش از دندان مندیبل از دست می‌رود.
ب) دندان‌های خلفی پیش از دندان قدامی از دست می‌رود.
ج) دندان‌های قدام ماگزیلا آخرین دندان‌های باقی مانده در دهان است.
د) تعداد بیماران بی‌دندان روند صعودی دارد.

۳- آخرین دندان‌های باقی مانده در دهان کدام است؟

- الف) قدام ماندیبل
ب) قدام مندیبل و ماگزیلا
ج) قدام مندیبل
د) خلف مندیبل

۴- آخرین دندان باقی مانده در دهان معمولاً کدام نوع است؟

- الف) پره مولرها
ب) مولرهای ۳ ریشه
ج) کانین‌ها
د) انسیزور بالا

۵- کدام جمله صحیح نمی‌باشد؟

- الف) بی‌دندانی پارسیل در ماگزیلا شایع‌تر است.
ب) شایع‌ترین دندان‌های از دست رفته مولرهای اول و دوم هستند.
ج) آخرین دندان‌های باقی مانده در دهان قدام مندیبل به ویژه کانین است.
د) دندان‌های خلف بیشتر از قدام از دست می‌روند (به دلیل مشکلات پریودنتمال بیشتر)

- ۶- کدام یک ریسک پوسیدگی بیشتری دارد؟**
- الف) ۳ بالا
ب) ۴ پایین
ج) ۱ و ۲ پایین

- ۷- کدام یک در مورد پیامدهای کشیدن دندان صحیح نمی‌باشد؟**
- الف) میزان از دست رفتن استخوان در مندیبل بیشتر از ماگزیلاست.
ب) از دست رفتن استخوان در ماگزیلا باعث ایجاد قوس تنگ‌تر می‌شود.
ج) میزان استخوان از دست رفته در خلف بیشتر از قدم است.
د) ایمپلنت توانایی حفظ عرض استخوان به‌دنبال کشیدن دندان را ندارد.

- ۸- کدام یک حساسترین فیدبک حس دهان را دارد؟**
- الف) پریوست
ب) مخاط
ج) مکانورسپتور پریودنتال
د) مفصل TM

- ۹- کدام یک جزء منابع فیدبک حس دهان نمی‌باشد؟**
- الف) لشه
ب) استخوان
ج) مفصل TM
د) عضلات

- ۱۰- کدام یک با احتمال بیشتری جزء شکایت اصلی بیمار می‌باشد؟**
- الف) زیبایی
ب) راحتی
ج) فانکشن
د) تکلم

- ۱۱- کدام گزینه، در مورد جویدن صحیح نمی‌باشد؟**
- الف) شامل ۲ مرحله هماهنگ (خرد کردن غذا و انتقال آن‌ها به انتهای زبان جهت بلع) است.
ب) اندازه، شکل و قوام ذرات بر هر ضربه جویدن مؤثر است.
ج) ذرات بزرگ‌تر سریعتر جویده می‌شوند.
د) ورودی حسی بر ناحیه هر ضربه مؤثر است.

۱۲- کدام یک در مورد کارایی جویدن صحیح نمی باشد؟

- الف) به توانایی خرد کردن غذا به اندازه خاص در چهارچوب زمانی خاص گفته می شود.
- ب) با تعداد دندان های اکلود شده رابطه قوی دارد.
- ج) در افرادی که مولر از دست داده اند تعداد ضربه های جویدن بیشتر می شود.
- د) در افرادی که مولر از دست داده اند اندازه ذرات قبل بلع کوچکتر می شود.

۱۳- کدام یک در مورد توانایی جویدن صحیح نمی باشد؟

- الف) هر چه توانایی جویدن بیشتر باشد، ذرات غذایی در آستانه بلع کوچکتر خواهد بود.
- ب) هر چه مساحت تماس اکلوزال بیشتر باشد، زمان بیشتری برای جویدن مورد نیاز است.
- ج) هرچه غلظت و اندازه ذرات غذایی بیشتر باشد، زمان بیشتری برای جویدن مورد نیاز است.
- د) در صورت مهاجرت دیستالی یا لبیالی دندان هادر اثر از دست رفتن دندان خلفی، نیاز به جاگذاری آن ها نمی باشد.

۱۴- کدام الگوی استفاده پروتز شیوع بیشتری دارد؟

- ب) دنچر کامل بالا، پارسیل پایین الف) پارسیل ۲ فک
- د) پارسیل بالا، دنچر کامل پایین ج) دنچر کامل دو فک

۱۵- کدام جمله در مورد دنچر پارسیل صحیح است؟

- الف) فقدان گیر مهمترین مشکل در آن هاست.
- ب) در مندبیل فقدان گیر ۲ برابر شایع تر از فقدان ثبات بود.
- ج) مهمترین نقش ایمپلنت در پروتز بی دندانی پارسیل ایجاد ثبات است.
- د) در مانگزیلا فقدان گیر ۵ برابر شایع تر از فقدان ثبات بود.

۱۶- بیشترین و کمترین شیوع مشکلات در پروتز مانگزیلا کدام است؟

- ب) ثبات، ریلاین الف) ثبات، سایش
- د) یکپارچگی، ریلاین ج) یکپارچگی، سایش

پاسخنامه – فصل ۱: اپیدمیولوژی، واژه شناسی و فیزیولوژی بی دندانی پارسیل / فصل ۱ رفرنس

۱- گزینه "ب" – صفحه ۱۵ درسنامه پاراگراف ۱

تمام درمان های پروتزی (از جمله درمان بی دندانی پارسیل) ۳ هدف را دنبال می کنند:

- (۱) حذف بیماری های دهان تا بیشترین میزان ممکن
- (۲) حفظ روابط دندان ها سلامت ساختارهای دندانی و اطراف دهان
- (۳) بازسازی فانکشن های دهانی با هدف تامین راحتی و زیبایی مطلوب بیمار و نیز عدم تداخل با تکلم

۲- گزینه "ج" – صفحه ۱۵ درسنامه پاراگراف ۲

- از دست رفتن دندان ها مرتبط با افزایش سن است.
- دندان های ماگزیلا پیش از دندان های مندیبل از دست می روند.
- دندان های خلفی پیش از دندان های قدامی از دست می روند چرا که مستعد تر به پوسیدگی هستند.
- آخرین دندان های باقی مانده در دهان غالباً دندان های قدامی مندیبل به ویژه کائین ها هستند.
- یک یافته‌ی بالینی شایع، ماگزیلا بی دندان در مقابل دندان های قدامی مندیبل است.
- اگرچه نسبت جمعیت بزرگسال بی دندان در حال کاهش است اما تعداد مطلق بیماران بی دندان مراقبت روندی صعودی دارد.

۳- گزینه "ج" – صفحه ۱۵ درسنامه پاراگراف ۲ خط ۴

آخرین دندان های باقی مانده در دهان غالباً دندان های قدامی مندیبل به ویژه کائین ها هستند.

۴- گزینه "ج" – صفحه ۱۵ درسنامه پاراگراف ۲ خط ۴

آخرین دندان های باقی مانده در دهان غالباً دندان های قدامی مندیبل به ویژه کائین ها هستند.

۵- گزینه "د" - صفحه ۱۵ درسنامه پاراگراف ۲

- از دست رفتن دندان ها مرتبط با افزایش سن است.
- دندان های ماگزیلا پیش از دندان های مندیبل از دست می روند.
- دندان های خلفی پیش از دندان های قدامی از دست می روند چرا که مستعد تر به پوسیدگی هستند.
- آخرین دندان های باقی مانده در دهان غالباً دندان های قدامی مندیبل به ویژه کانین ها هستند.
- یک یافته‌ی بالینی شایع، ماگزیلای بی دندان در مقابل دندان های قدامی مندیبل است.
- اگرچه نسبت جمعیت بزرگسال بی دندان در حال کاهش است اما تعداد مطلق بیماران بی دندان مراقبت روندی صعودی دارد.

بی دندانی پارسیل در ماگزیلا شایع تر است و مولر های اول و دوم، شایع ترین دندان های از دست رفته هستند.

۶- گزینه "ج" - صفحه ۱۵ درسنامه

خطر کم	خطر زیاد
۳ بالا و ۴ پایین	۶ و ۷ پایین
۱ و ۲ و ۳ پایین	۶ و ۷ بالا
	۵ پایین
	۱ و ۲ و ۴ و ۵ بالا

۷- گزینه "د" - صفحه ۱۶ درسنامه مبحث پیامد های از دست رفتن دندان

پیامد های از دست رفتن دندان

در دو جنبه‌ی آناتومیک و فیزیولوژیک بررسی می شود:

جنبه‌ی آناتومیک:

با از دست رفتن دندان ها و نبود تحرک فانکشنال، حجم ریح (شامل عرض و ارتفاع آن) کاهش می یابد، مگر آن که ایمپلنت قرار داده شود.

به دلیل آنatomی متفاوت افراد، میزان از دست رفتن استخوان قابل پیشگویی نیست.

میزان از دست رفتن استخوان در مندیبل بیش از ماگزیلا و در خلف بیش از قدام است.

به دنبال تحلیل استخوان، قوس مندیبل وسیع تر و قوس ماگزیلا تنگ تر می شود.

۸- گزینه "ج" - صفحه ۱۶ درسنامه مبحث جنبه‌ی فیزیولوژیک حرکات مندیبل هنگام جویدن توسط فیدبک حس دهان سازماندهی می‌شود. این فیدبک از سوی منابع مختلفی تأمین می‌شود که شامل:

- مکانورسپتور‌های پریودنتال (periodontal mechanoreceptor or PMRs) که حساس ترین ورودی هستند و دقیق‌ترین و ظرفی‌ترین حرکات کنترل شده را هدایت می‌کنند.
- لثه
- مخاط
- پریوست/ استخوان
- مفصل تمپورومندیبولا

۹- گزینه "د" - صفحه ۱۶ درسنامه مبحث جنبه‌ی فیزیولوژیک حرکات مندیبل هنگام جویدن توسط فیدبک حس دهان سازماندهی می‌شود. این فیدبک از سوی منابع مختلفی تأمین می‌شود که شامل:

- مکانورسپتور‌های پریودنتال (periodontal mechanoreceptor or PMRs) که حساس ترین ورودی هستند و دقیق‌ترین و ظرفی‌ترین حرکات کنترل شده را هدایت می‌کنند.
- لثه
- مخاط
- پریوست/ استخوان
- مفصل تمپورومندیبولا

۱۰- گزینه "الف" - صفحه ۱۶ درسنامه کادر سبز رنگ از دست رفتن زیبایی ناشی از نبود دندان‌ها می‌تواند برای بیمار دغدغه‌ی مهم تری نسبت به از دست رفتن فانکشن باشد.

- ۱۱- گزینه "الف"** - صفحه ۱۷ درسنامه مبحث جویدن
- (۱) تقسیم/ خرد کردن غذا با کمک نیروی اعمال شده: شامل انتخاب یک ذره وسیس خرد شدن آن. ورودی‌های حسی شامل اندازه، شکل و قوام ذرات غذایی بر شکل و ناحیه‌ی هر ضربه‌ی جویدن موثر است. اندازه‌ی ذرات بزرگ‌تر در جویدن موثر، به طور انتخابی سریع‌تر از ذرات ریز کاهش می‌یابد.
 - (۲) آماده سازی انتخابی با زبان و گونه‌ها جهت مرتب سازی ذرات درشت و انتقال آن‌ها به سطوح اکلوزال دندان‌ها جهت تخریب بیشتر

۱۲- گزینه "ج" - صفحه ۱۷ درسنامه مبحث کارآیی جویدن (Masticatory efficiency) کارآیی جویدن (Masticatory efficiency)

شاخص خرد کردن غذا، کارآیی جویدن نام دارد که به صورت توانایی خرد کردن ذرات غذایی به یک اندازه‌ی خاص در چهارچوب زمانی تعريف می‌شود.

میان کارآیی جویدن و تعداد دندان‌های اکلود شده در افراد با دندان رابطه‌ای قوی برقرار است. تفاوت در انتخاب ذرات غذایی با تعداد دندان‌های در تماس مرتبط است.

نکته: حتی در بیمارانی با تعداد یکسان دندان‌های در تماس، اندازه‌گیری فانکشن بسیار متنوع است. این تنوع با افزایش درجات بی دندانی افزایش می‌یابد.

بین مساحت دندان‌های در تماس و فانکشن جویدن ارتباط قابل توجهی وجود دارد. بنابراین از دست رفتن دندان‌های مولر بیشتر از سایر دندان‌ها بر فانکشن موثر است.

در افرادی که دندان‌های مولر را از دست داده اند تعداد ضربات مورد نیاز برای جویدن بیشتر و اندازه‌ی متوسط ذرات قبل از بلع بزرگتر می‌باشد.

۱۳- گزینه "د" - صفحه ۱۸ درسنامه کادر سبز رنگ و متن ذیل

توانایی جویدن بالاتر که با مساحت تماس اکلوزال ارتباط قوی دارد منجر به بیشتر خرد شدن ذرات غذایی در آستانه‌ی بلع می‌شود.

با کاهش این توانایی، اندازه‌ی ذرات در آستانه‌ی بلع بزرگتر خواهد بود.

علیرغم اندازه‌گیری‌های عینی (Objective) که بر مزیت تماس مولری تاکید دارند، اندازه‌گیری ذهنی (Subjective) بیماران متفاوت است چرا که آن‌ها مشکلی در رابطه با فانکشن ناشی از وجود اکلوزن صرفا در پرمولرها بیان نمی‌کنند.

این مفهوم قوس دندانی کاهش یافته یا short-arch concept (بازسازی اکلوزن بیماران بی دندان تا دندان‌های پره مولر) این مسئله را روشن می‌کند که هنگام جایگزینی مولر‌های از دست رفته بیماران، درک بیمار از فانکشن کاهش یافته (ارزیابی آن‌ها در نظر گرفته شود).

نکته: در صورت مهاجرت دیستالی یا لبیالی دندان‌ها در اثر از دست رفتن دندان‌های خلفی، باید جایگزین کردن آن‌ها به طور جدی مد نظر قرار داده شود. این امر با مفهوم قوس دندانی کاهش یافته تفاوت دارد.

در افراد با دندان، غلظت‌های بیشتر و اندازه بزرگتر ذرات غذایی نیازمند زمان بیشتری جهت آماده سازی برای بلع هستند. به عبارت دیگر آستانه‌ی بلع بالاتری دارند.

۱۴- گزینه "الف" - صفحه ۱۸ درسنامه

نوع پروتز	توزیع	توزیع
دنچرهای پارسیل متحرک	RPD/-15.3%, -/RPD 4.5%	RPD/RPD 9.0%
دنچرهای کامل	CU/-20.7%	CU/CL 3.8%
ترکیب	RPD/CL 0.3%	CU/RPD 11.5%

۱۵- گزینه "ج" - صفحه ۱۹ درسنامه زیر جدول

مطابق با جدول:

- فقدان ثبات (Lack of stability) شایع ترین مشکل بود.
- در ماگزیلا، فقدان ثبات ۷ برابر شایع‌تر از فقدان گیر بود.
- در مندیبل، فقدان ثبات ۱/۸ برابر شایع‌تر از فقدان گیر بود.
- ثبات، خصوصیتی حیاتی برای ارزیابی بوده و خصوصیتی است که بیشترین سود را از کاربرد ایمپلنت دندانی که در موقعیت استراتژیک قرار گرفته است، می‌برد.

۱۶- گزینه "الف" - صفحه ۱۹ درسنامه کادر سبز رنگ

ماگزیلا:

ثبات > یکپارچگی > سایش > گیر > ریلاین

مندیبل:

ثبات > ریلاین > گیر > یکپارچگی > سایش